

複数条件でも、対象者候補を事前に見える化。

血液検査値 × 体組成 × 食事調査データを活用した、新しいリクルート設計




9/15号で着目した「日常飲酒なし・BMI 23.0以上」の層を対象に、

糖代謝・肝機能・糖質摂取の3条件への該当率を算出しました。

「この条件で、対象者はどのくらいいるのか？」実測データから見える化します。

1


糖代謝3区分の割合 (HbA1c区分)



▶約4割(38.2%)が「糖代謝高め層」に該当。
未病段階でのアプローチが期待できる、ボリュームの大きい層です。

2


肝機能低下リスクの割合 (ALT $\geq 30\text{U/L}$)



▶「お酒をほとんど飲まないから肝臓は問題ない」という思い込みに対し、日常的な飲酒習慣のない過体重以上の層において、約5人に1人(20.4%)に潜在的な肝機能低下(ALT $\geq 30\text{U/L}$)が確認されました。

3

糖質過剰摂取の割合 (CAND炭水化物比率 $\geq 60\%$)




▶食事調査票(CAND)により、日常的な飲酒習慣のない過体重以上の層の約4割(42.6%)が、炭水化物比率60%以上に該当。
自己申告だけでは捉えにくい「隠れ糖質過多」の実態を客観的に把握できます。

4

3条件トリプル重複層

(日常的な飲酒習慣のない過体重以上：
糖代謝高め × 肝機能低下 × 糖質過剰摂取)



▶過体重かつ糖代謝高め、肝機能低下リスクと糖質過剰摂取が重なるトリプル重複層は、約10人に1人(9.8%)存在し、即時抽出が可能です。

ご案内可能な試験テーマ

実際に抽出された対象者データをもとに、アプローチ可能な試験テーマをまとめました。

■糖代謝に関する試験	■肝機能(非アルコール性)に関する試験	■複数条件を組み合わせた試験
日常飲酒なし・過体重以上×糖代謝高め (HbA1c 5.6～6.4%)	日常飲酒なし・過体重以上×肝機能低下リスク (ALT ≥ 30 U/L)	日常飲酒なし・過体重以上×糖高め ×肝低下×糖質過多 (3条件重複)
38.2%	20.4%	9.8%
糖代謝試験の候補者へ	肝機能ケア試験の候補者へ	複数条件の試験候補者へ

一般的な市場調査・公募リクルートとの違い

一般的なアンケートパネル(自己申告)では、複数の客観的条件に合致する対象者を事前に特定することは困難です。

比較項目	一般的な市場調査・公募リクルート	オルトメディコ「ゴー・トーロク」の独自提案
① ターゲット特定	自己申告のみ(曖昧) 「飲酒量」や「糖質制限」は自己評価に依存し、ALT等の客観数値は不明。	客観数値で厳格特定 血液検査値(ALT・HbA1c)×CAND(食事調査票)から、条件に合致する対象者候補を事前に抽出。
② スクリーニング効率	条件該当者は約10% 今回の3条件への該当率は9.8%。事前に検査値等を把握できない場合、多数の候補者から条件合致者を絞り込む必要があります。	事前照合でスクリーニングを効率化 保有する検査値・食事データから条件合致者を事前に抽出し、対象候補者へ効率的にアプローチできます。

比較項目	一般的な市場調査・公募リクルート	オルトメディコ「ゴー・トーロク」の独自提案
③ 開発初期の検証	いきなり高額な本試験リスク 対象者数や実施可能性が見えないまま、本試験の計画を進める必要がある。	安価なプレ調査(リサーチ)対応 特定層へのプロトコル確認・受容性テスト・予備検証から低予算で着手可能。

開発段階に応じた柔軟なサポート(こんなお悩みを解決)

ゴー・トーロクでは、保有する多面的なデータを掛け合わせることで、貴社の試験プロトコルに合致する対象者候補を事前に抽出します。

こんなお悩み・ご要望	ゴー・トーロクでできること
「ALT 30 U/L 以上かつ日常的な飲酒習慣のないモニターが本当に集まるか不安」	保有データベースから飲酒歴(非飲酒・機会飲酒)×血液検査値を事前照合し、条件に合致する対象者候補数を算出します。
「糖質摂取割合が高い層を、客観的なデータに基づいて抽出したい」	自己申告アンケートではなく、CAND(食事調査票)の栄養素算定データ(炭水化物比率 60%以上等)を用いて、条件に合致する対象者候補を抽出します。
「本試験に入る前に、プロトコルの確度や試作品の反応を確かめたい」	特定モニターに対する小規模なプレ検証(体感・受容性・単回投与バイオマーカー測定など)を安価・迅速に実施可能です。

営業部より:まとめ & アクションのご案内

「集められるか分からない」を、試験開始前に「何名いるか」へ。

ゴー・トーロクでは、血液検査値・体組成・食事調査データなどを組み合わせ、複数条件に合致する対象者候補を事前に抽出できます。

- ・「この条件で何名集められるのか」
- ・「条件を少し変更すると対象者数はどう変わるのか」
- ・「本試験前に小規模な予備検証ができないか」

ゴー・トーロクレポート

20260930
no.6

といった試験計画段階のご相談からサポートします。

対象条件をご提示いただければ、保有データから候補者数をシミュレーションします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お客さまの声.com では、対象者分布の確認、アンケート、座談会、試作品評価、短期の予備調査まで、商品開発段階に応じた検証をご提案します。

TEL:03-3812-0620



判定基準・注記

- ・母集団：エントリー検査の問診において「非飲酒（飲まない）」または「機会飲酒（年・月数回程度）」と回答した日常的な飲酒習慣のない過体重以上の層（BMI 23.0 以上）
- ・糖代謝高め：HbA1c 5.6～6.4%
- ・肝機能低下リスク：ALT $\geq$ 30 U/L
- ・糖質過剰摂取：CAND（食事調査票）による総摂取エネルギーに対する炭水化物比率 60%以上